

De quel côté perfuser ?

LAPAROTOMIE

Chirurgie sus mésocolique : perfuser à gauche (table pont aux pieds)

Chirurgie sous mésocolique : perfuser à droite (table pont sur la tête)

Intervention	Côté à perfuser
Hépatectomie droite au gauche DPC ou double dérivation Pancréatite Splénectomie Gastrectomie Voies biliaires Cholécystectomie Caecum Colon droit Oesophage	GAUCHE (bras droit le long du corps)
ACA : anastomose colo anale ACR : anastomose colo rectale AIA : anastomose iléo anale AIR : anastomose iléo rectale AAP : amputation abdomino périnéale Fistule du grêle Les positions « RECTUM »	DROIT (bras gauche le long du corps)
Thyroïde (2 bras le long du corps+rallonge perfusion) Proctologie	INDIFFERENT

Installation pour intervention par coelioscopie

Les 2 premiers sont obligatoires

AIA
Colectomie sub totale
Orr-Loygue

Les 3 autres sont facultatives

Colostomie/ileostomie
Nissen
Gastrectomie
Pancréatectomie
Œsophage Lewis Santy
Splénectomie
Chirurgie hépatique : hepatectomie dte, lobectomie gche,
tumorectomie, donneur vivant

Les 3 autres sont facultatives

Appendicectomie
Côlon droit
Cholecystectomie